



๓ อ. ๓ ส.

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สร้างสังคมสุขภาพดี วัฒธรรม วิถีไทย



สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชน ไม่ประมาท ห่วง”เมลิอยด์โดซิส”ระบาดช้า

นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่า จากกรณีที่มีการระบาดของโรคเมลิอยด์โดซิสในจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรยังคงความเข้มข้นในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดต่อจากการสัมผัสกับดินหรือน้ำผ่านทางแผลหรือผิวนัง หรือหายใจเข้าผ่านจากดินที่มีเชื้อเจือปน เชื้อเมลิอยด์โดซิสสามารถอยู่ได้ในชากระดับต่ำ ที่อยู่ในดินและน้ำ ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ ชาวนา รับจ้าง ที่ต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำเป็นประจำ สถานการณ์ของโรคเมลิอยด์โดซิสในจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบรู้ป่วยทั้งหมด ๕๕ รายเฉลี่ยเกือบทุกอำเภอ มีผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย ที่อำเภอเมืองพิจิตร กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ ๕๐-๕๔ ปี รองลงมาคือ อายุ ๕-๙ ปี และ อายุ ๑๕-๑๙ ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน และประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ ตะพานหิน วังทรายพูน วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง และเมืองพิจิตร และเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุด

นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ กล่าวต่อไปว่า โรคเมลิอยด์โดซิส เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย พบรู้ป่วยในคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น แพะ แกะ หมู โค กระเบื้อง ส่วนในคนพบทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ในประเทศไทยมีผู้ป่วย ๒๐๐๐-๓๐๐๐ รายต่อปี พบรู้ป่วยในฤดูฝน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุดอาการของโรค แบ่งเป็น ๓ แบบ ได้แก่ ๑.อาการไข้ナンไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลด ต่อม腋จีงเกิดอาการรุนแรงขึ้น ๒.อาการของการติดเชื้อเฉพาะที่ ส่วนใหญ่พบรู้ป่วยติดเชื้อที่ปอด ซึ่งมีอาการเหมือนปอดอักเสบ คือมีไข้ ไอ มีเสมหะเล็กน้อย น้ำหนักลด บางรายไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก บางรายมีอาการของฝีในตับ ฝีในกระดูก ๓.การติดเชื้อในกระแสโลหิต เชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปทั่วร่างกายและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว การป้องกันโรค ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเมลิอยด์โดซิส ดังนั้นประชาชนควรมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค เช่นกรณีมีบาดแผลเมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำให้รีบทำความสะอาดทันที ส่วนบุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน และแพลงก์ตอนเด็กรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำ เช่น ในไร่นา หรือ ในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคนี้เป็นประจำ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมรองเท้าบูทป้องกัน โรคเมลิอยด์โดซิสมักพบอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตในคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต ทั้งนี้มักมีการกลับซ้ำของโรคในกรณีให้การรักษาระยะสั้นและผู้ป่วยมีภาวะภูมิต้านทานบกพร่อง จึงขอเตือนประชาชนให้ค่อยสังเกตอาการหากมีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือมีข้อสงสัยให้รีบมาพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที